bien vivre avec le psoriasis

Thérapie biologique

BIOLOGIQUES

TRAITEMENT	MODE D'EMPLOI	AVANTAGES	EFFETS SECONDAIRES*
Agents immuno-modulateurs : • ustekinumab (STELARA®)	• Après la première injection, on injecte à nouveau STELARA® au bout de 4 semaines (1 mois). • Après cette deuxième injection, on l'injecte ensuite toutes les 12 semaines (3 mois). • Le patient peut s'auto-injecter après avoir appris la technique d'injection, ou le produit peut être administré par un professionnel de la santé. • Avant le début du traitement, votre médecin vous examinera ou vous fera passer un test de dépistage de la tuberculose (TB). Ne doit pas être utilisé : • si vous êtes atteint d'une infection grave comme la tuberculose, d'une infection bactérienne ou fongique qui s'est propagée dans tout l'organisme ou si vous présentez une hypersensibilité constituant une contre-indication.	• Inhibe l'action des protéines qui peuvent stimuler le système immunitaire à attaquer certaines parties du corps, comme la peau et les ongles.	Effets secondaires les plus fréquents : • Infections des voies respiratoires supérieures (p. ex., rhume) et maux de tête. Autres effets secondaires : • STELARA® peut diminuer votre capacité à combattre les infections. Certaines infections peuvent devenir graves et entraîner une hospitalisation. Si votre médecin pense que vous risquez de développer une tuberculose, il se peut que vous deviez suivre un traitement antituberculeux avant de commencer le traitement par STELARA® et au cours du traitement par STELARA®. De nombreux médicaments comme STELARA® qui sont capables de réduire l'activité du système immunitaire peuvent augmenter le risque de cancer. Les autres effets secondaires très fréquents ou fréquents comprennent le mal de gorge, la congestion nasale et les réactions allergiques (éruption cutanée). Les effets secondaires peu fréquents ou rares comprennent la cellulite (infection cutanée) et une réaction allergique grave (p. ex., gonflement du visage ou difficulté à respirer).

*Consultez toujours votre médecin et lisez la notice d'emballage avant d'essayer un nouveau traitement. Pour chaque traitement, veuillez consulter les renseignements destinés au patient pour obtenir les mises en garde et précautions et les renseignements thérapeutiques. Les listes ci-dessus ne constituent pas une liste complète des effets secondaires. Votre professionnel de la santé peut vous fournir la liste complète. De plus, parlez à votre professionnel de la santé si les effets indésirables persistent ou s'ils sont graves.

Toutes les marques de commerce de tierces parties appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© Janssen Inc. 2014. Ce site s'adresse aux résidents canadiens. Dernière mise à jour : juin 2014.

Thérapie biologique

BIOLOGIQUES

TRAITMENT	MODE D'EMPLOI	AVANTAGES	EFFETS SECONDAIRES*
Inhibiteurs du TNF-alpha : • l'infliximab (REMICADE®) • l'adalimumab (HUMIRA®) • l'étanerept (ENBREL®)	**REMICADE® :** • Perfusion de 2 heures dans un centre de perfusion. • REMICADE® est administré par perfusion intraveineuse (i.v.), dans un centre de perfusion spécialisé doté de personnel infirmier formé et d'autres professionnels de la santé qualifiés. • Trois perfusions au cours des six premières semaines (au début du traitement, à la semaine 2, puis à la semaine 6), puis une fois tous les deux mois. **REMICADE®** **Ne doit pas être utilisé :** • si vous avez une infection grave, comme une septicémie (une infection dans le sang), un abcès, la tuberculose ou une autre infection grave; • si vous êtes atteint d'une insuffisance cardiaque (modérée ou grave); • si vous êtes allergique à l'infliximab ou à l'un de ses ingrédients, ou si vous avez déjà eu une réaction allergique aux protéines de souris.	• Inhibe le facteur de nécrose tumorale (TNF) alpha (le facteur TNF-alpha est produit par le système immunitaire de l'organisme et interfère avec la réponse de l'organisme à l'inflammation).	**Effets secondaires les plus fréquents :** • Douleurs abdominales, maux de dos, toux, diarrhée, étourdissements, fatigue, démangeaisons, douleur, infections des voies respiratoires supérieures (p. ex., bronchite, sinusite, rhume, mal de gorge), maux d'estomac et infections urinaires. **Autres effets secondaires :** • REMICADE® pourrait exercer une légère influence sur la capacité à conduire et à utiliser des machines. Des étourdissements pourraient survenir à la suite de l'administration de REMICADE®. **Effets secondaires graves fréquents :** • Infections graves et réactions allergiques. **Effets secondaires graves peu fréquents :** • Lésion hépatique, insuffisance cardiaque, problèmes sanguins et troubles du système nerveux, cancer et lupus.

*Consultez toujours votre médecin et lisez la notice d'emballage avant d'essayer un nouveau traitement. Pour chaque traitement, veuillez consulter les renseignements destinés au patient pour obtenir les mises en garde et précautions et les renseignements thérapeutiques. Les listes ci-dessus ne constituent pas une liste complète des effets secondaires. Votre professionnel de la santé peut vous fournir la liste complète. De plus, parlez à votre professionnel de la santé si les effets indésirables persistent ou s'ils sont graves.

Toutes les marques de commerce de tierces parties appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© Janssen Inc. 2014. Ce site s'adresse aux résidents canadiens. Dernière mise à jour : juin 2014.

Thérapie biologique

BIOLOGIQUES

TRAITMENT	MODE D'EMPLOI	AVANTAGES	EFFETS SECONDAIRES*
Inhibiteurs du TNF-alpha : • l'infliximab (REMICADE®) • l'adalimumab (HUMIRA®) • l'étanerept (ENBREL®)	**HUMIRA®:** • Une fois par semaine pendant les deux premières semaines, puis une semaine sur deux par la suite (4 injections par mois). • Avec une formation adéquate, le patient peut s'injecter lui-même le médicament, ou bien l'injection peut être administrée par un professionnel de la santé. **HUMIRA®** **Ne doit pas être utilisé :** • si vous avez une infection grave, comme la tuberculose, une infection bactérienne ou fongique, ou une septicémie (une infection dans le sang); • si vous êtes atteint d'une insuffisance cardiaque (modérée ou grave); • si vous êtes allergique à l'un des ingrédients.	• Inhibe le facteur de nécrose tumorale (TNF) alpha (le facteur TNF-alpha est produit par le système immunitaire de l'organisme et interfère avec la réponse de l'organisme à l'inflammation).	**HUMIRA®:** **Effets secondaires graves les plus fréquents :** • Réactions au site d'injection. **Autres effets secondaires graves :** • Infections des voies respiratoires supérieures, maux de tête, éruption cutanée, nausée, appendicite et augmentation du taux d'enzymes hépatiques. **Effets secondaires graves peu fréquents :** • Tuberculose, autres infections graves, troubles nerveux, herpès simplex (boutons de fièvre), pneumonie, bronchopneumonie, pharyngite streptococcique et diminution du nombre de globules blancs.

*Consultez toujours votre médecin et lisez la notice d'emballage avant d'essayer un nouveau traitement. Pour chaque traitement, veuillez consulter les renseignements destinés au patient pour obtenir les mises en garde et précautions et les renseignements thérapeutiques. Les listes ci-dessus ne constituent pas une liste complète des effets secondaires. Votre professionnel de la santé peut vous fournir la liste complète. De plus, parlez à votre professionnel de la santé si les effets indésirables persistent ou s'ils sont graves.

Toutes les marques de commerce de tierces parties appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© Janssen Inc. 2014. Ce site s'adresse aux résidents canadiens. Dernière mise à jour : juin 2014.

Thérapie biologique

BIOLOGIQUES

TRAITMENT	MODE D'EMPLOI	AVANTAGES	EFFETS SECONDAIRES*
Inhibiteurs du TNF-alpha : • l'infliximab (REMICADE®) • l'adalimumab (HUMIRA®) • l'étanerept (ENBREL®)	ENBREL[MD] : • Deux fois par semaine pendant trois mois, suivi d'une dose d'entretien une ou deux fois par semaine (4 à 8 injections par mois). • Avec une formation adéquate, le patient peut s'injecter lui-même le médicament, ou bien l'injection peut être administrée par un professionnel de la santé. ENBREL[MD*] Ne doit pas être utilisé : • si vous êtes allergique à l'étanercept ou à l'un de ses ingrédients; • si vous avez une septicémie.	• Inhibe le facteur de nécrose tumorale (TNF) alpha (le facteur TNF-alpha est produit par le système immunitaire de l'organisme et interfère avec la réponse de l'organisme à l'inflammation).	ENBREL[MD] : Effets secondaires graves les plus fréquents : • Réactions au site d'injection. Effets secondaires graves fréquents : • Infections des voies respiratoires supérieures et maux de tête. Effets secondaires graves peu fréquents : • Infections graves, tuberculose et troubles nerveux.

*Consultez toujours votre médecin et lisez la notice d'emballage avant d'essayer un nouveau traitement. Pour chaque traitement, veuillez consulter les renseignements destinés au patient pour obtenir les mises en garde et précautions et les renseignements thérapeutiques. Les listes ci-dessus ne constituent pas une liste complète des effets secondaires. Votre professionnel de la santé peut vous fournir la liste complète. De plus, parlez à votre professionnel de la santé si les effets indésirables persistent ou s'ils sont graves.

Toutes les marques de commerce de tierces parties appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© Janssen Inc. 2014. Ce site s'adresse aux résidents canadiens. Dernière mise à jour : juin 2014.